

# Zestawienie działań niepożądanych po szczepieniach przeciw COVID-19

Częstość występowania działań niepożądanych	COMIRNATY <i>BioNTech-Pfizer</i>	SPIKEVAX <i>Moderna-Biotech</i>	VAXZEVRIA <i>AstraZeneca</i>	COVID-19 Vaccine Janssen <i>Johnson &amp; Johnson</i>
	ChPL – aktualizacja z 29.07.2021	ChPL – aktualizacja z 24.08.2021	ChPL – aktualizacja z 16.08.2021	ChPL – aktualizacja z 04.08.2021
uwagi	Po szczepieniu zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez <b>co najmniej 15 minut</b> . Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce prod. leczniczego Comirnaty.	Po szczepieniu zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez <b>co najmniej 15 minut</b> . Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce prod. leczniczego Spikevax	Po szczepieniu zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez <b>co najmniej 15 minut</b> . Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce prod. leczniczego Vaxzevria.	Po szczepieniu zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez <b>co najmniej 15 minut</b> .
<b>BARDZO CZĘSTO</b> $\geq 1/10$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ból głowy</li> <li>• ból mięśni</li> <li>• ból stawów</li> <li>• ból } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• obrzęk } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• zmęczenie</li> <li>• dreszcze</li> <li>• gorączka (<i>w większości po drugiej dawce</i>)</li> <li>• biegunka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ból głowy</li> <li>• ból mięśni</li> <li>• ból stawów</li> <li>• sztywność stawów</li> <li>• ból } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• obrzęk } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• nudności</li> <li>• wymioty</li> <li>• zmęczenie</li> <li>• dreszcze</li> <li>• gorączka</li> <li>• limfadenopatia (<i>powiększone węzły chłonne pod pachą po tej samej stronie co miejsce wstrzyknięcia. W niektórych przypadkach obejmowała ona również inne węzły chłonne np. szyjne, nadobojczykowe</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ból głowy</li> <li>• ból mięśni</li> <li>• ból stawów</li> <li>• nudności</li> <li>• zmęczenie</li> <li>• złe samopoczucie</li> <li>• uczucie gorączki</li> <li>• dreszcze</li> <li>• tkliwość } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• ból } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• ucieplenie } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• świąd</li> <li>• siniaki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ból głowy</li> <li>• ból mięśni</li> <li>• ból <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• nudności</li> <li>• zmęczenie</li> </ul>
<b>CZĘSTO</b> $\geq 1/100$ do $< 1/10$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nudności</li> <li>• wymioty</li> <li>• zaczerwienienie <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wysypka</li> <li>• zaczerwienienie } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• pokrzywka } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• wysypka</li> <li>• opóźniona reakcja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymioty</li> <li>• biegunka</li> <li>• gorączka <math>\geq 38^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• rumień } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• obrzęk } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• małopłytkowość – <i>łagodna, przemijająca</i></li> <li>• ból kończyn</li> <li>• astenia (<i>uczucie osłabienia fizycznego i psychicznego</i>)</li> <li>• choroba grypopodobna (<i>objawy takie jak: wysoka temperatura, ból gardła, katar, kaszel i dreszcze</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kaszel</li> <li>• ból stawów</li> <li>• gorączka</li> <li>• dreszcze</li> <li>• rumień } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> <li>• obrzęk } <i>w miejscu wstrzyknięcia</i></li> </ul>

# Zestawienie działań niepożądanych po szczepieniach przeciw COVID-19

	COMIRNATY <i>BioNTech-Pfizer</i>	SPIKEVAX <i>Moderna-Biotech</i>	VAXZEVRIA <i>AstraZeneca</i>	COVID-19 Vaccine Janssen <i>Johnson &amp; Johnson</i>
<b>NIEZBYT CZĘSTO</b> ≥1/1 000 do <1/100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezsenność</li> <li>• ból kończyny w którą wykonano wstrzyknięcie</li> <li>• świąd w miejscu wstrzyknięcia</li> <li>• złe samopoczucie</li> <li>• limfadenopatia (powiększone węzły chłonne)</li> <li>• reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, świąd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zawroty głowy</li> <li>• świąd w miejscu wstrzyknięcia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zawroty głowy</li> <li>• senność</li> <li>• limfadenopatia (powiększone węzły chłonne)</li> <li>• zmniejszony apetyt</li> <li>• nadmierna potliwość</li> <li>• świąd</li> <li>• wysypka</li> <li>• krwiak (w miejscu wstrzyknięcia)</li> <li>• ból brzucha</li> <li>• pokrzywka</li> <li>• letarg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drżenie</li> <li>• kichanie</li> <li>• ból gardła</li> <li>• wysypka</li> <li>• nadmierna potliwość</li> <li>• osłabienie mięśni</li> <li>• ból kończyn</li> <li>• ból pleców</li> <li>• astenia (uczucie osłabienia fizycznego i psychicznego)</li> <li>• złe samopoczucie</li> </ul>
<b>RZADKO</b> ≥1/10 000 do <1/1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego (jednostronne, przemijające)</li> <li>• reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, obrzęk naczyń ruchomy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego (jednostronne, przemijające)</li> <li>• obrzęk twarzy (może wystąpić u pacjentów, którzy otrzymali wcześniej wstrzyknięcia wypełniaczy dermatologicznych w obrębie twarzy)</li> <li>• niedoczulica (osłabienie zmysłu dotyku lub odczuwania bodźców)</li> </ul>	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadwrażliwość (dotycząca reakcji alergicznej skóry i tkanki podskórnej)</li> <li>• pokrzywka</li> </ul>
<b>BARDZO RZADKO</b> <1/10 000	-----	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakrzepica w połączeniu z małopłytkowością (dot. zakrzepicy żyłnej, takiej jak: zakrzepica zatok żylnych mózgu, zakrzepica żył trzewnych oraz zakrzepicy tętniczej)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zespół Guillain-Barré (zapalenie nerwów, które może powodować porażenie i trudności w oddychaniu)</li> <li>• zakrzepica w połączeniu z małopłytkowością (dot. zakrzepicy żyłnej, takiej jak: zakrzepica zatok żylnych mózgu, zakrzepica żył trzewnych oraz zakrzepicy tętniczej)</li> </ul>
<b>CZĘSTOŚĆ NIEZNANA</b> częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anafilaksja</li> <li>• zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie błony wokół serca (zapalenie osierdzia), które może prowadzić do duszności, kołatania serca lub bólu w klatce piersiowej</li> <li>• rozległy obrzęk kończyny (w którą podano szczepionkę)</li> <li>• obrzęk twarzy (może wystąpić u osób, którym wcześniej w obrębie twarzy wstrzykiwano wypełniacze dermatologiczne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anafilaksja</li> <li>• nadwrażliwość</li> <li>• zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie błony wokół serca (zapalenie osierdzia), które może prowadzić do duszności, kołatania serca lub bólu w klatce piersiowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anafilaksja</li> <li>• nadwrażliwość</li> <li>• zespół przesiąkania włóściczek</li> <li>• obrzęk naczyń ruchomy (szybko pojawiający się obrzęk podskórny w miejscach takich jak twarz, usta, jama ustna i gardło (co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anafilaksja</li> <li>• zespół przesiąkania włóściczek</li> </ul>